

2009年7月制定

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

東洋の麻黄湯エキス顆粒

(まおうとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」に記載されている麻黄湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)。
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸の弱い人。
 - (4) 発汗傾向の著しい人。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。：むくみ、排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	そ の 他	発汗過多、全身脱力感
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

風邪のひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、身体のふしぶしが痛い場合の次の諸症：感冒、鼻かぜ

【用法・用量】

下記の量を食前又は食間に水又は温湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人 (15才以上)	1包	3回	7才未満 4才以上	1/2包	3回
15才未満 7才以上	2/3包		4才未満 2才以上	1/3包	
			2才未満		服用しないこと

【用法及び用量に関連する注意】

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 [本品1日量3包(1包2g)中]

日本薬局方 マ オ ウ……………5.0g	日本薬局方 ケ イ ヒ……………4.0g
日本薬局方 キ ヨ ウ ニ ン……………5.0g	日本薬局方 カ ン ソ ウ……………1.5g
	より製した水製乾燥エキス……………1.8g
	添加物として乳糖、バレイショデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。
- (5) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」
電話 06-6211-4976
受付時間 9：00～17：00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931

製造販売元
東洋漢方製薬株式会社
〒584-0022 大阪府富田市中野町東2丁目1番16号